

引用文献

- Abaiger, T., G. Del Barrio, & J. R. Vericad (1994) Habitat preference of wild boar (*Sus scrofa* L., 1758) in a mediterranean environment. Indirect evaluation by signs. Mammalia, 58:201-210.
- 阿部永・石井信夫・金子之史・前田喜四雄・三浦慎悟・米田政明 (1994) 「日本の哺乳類」. 東海大学出版会, 195p, 東京.
- 藍澤宏・有泉龍之 (1995) 過疎地域における集落人口変容からみた集落類型に関する研究. 農村計画学会誌, 14:18-29.
- 藍澤宏・古川英樹 (1992) 農業的土地利用からみた集落の類型とその構造変化に関する研究. 日本建築学会計画系論文報告書, 434:79-88.
- 藍澤宏・林宏規・保住秀樹 (1995) 農村地域における地域資源からみた集落類型に関する研究. 農村計画学会誌, 13:7-18.
- 朝日稔 (1975) 狩猟期におけるイノシシの胃内容物. 哺乳動物学雑誌, 6:115-120.
- 朝日稔 (1978) イノシシ, クマ類およびシカの捕獲数の変動. 哺乳動物学雑誌, 7:206-218.
- 朝日稔 (1985) 資源としてのイノシシ. 哺乳類科学, 50:27-30.

朝日稔・人見康子・山本教子 (1972) イノシシの捕獲数の変動と気象条件. 哺乳動物学雑誌, 5:181-185.

朝日稔・四手井綱英・森美保子 (1975) イノシシおよびシカの捕獲と植生区分 —京都府における調査から—. 生物科学, 27:159-168.

Baber, D. W. & B. E. Coblentz (1986) Density, home range, habitat use, and reproduction in feral pigs on Santa Catalina Island. Journal of Mammalogy, 67:512-525.

Barber, D. W. & B. E. Coblentz (1987) Diet, nutrition, and conception in feral pigs on Santa Catalina Island. Journal of Wildlife Management, 51:306-317.

Barrett, R. H. (1978) The feral hog at Dye Creek Ranch, California. Hilgardia, 46:283-355.

Breckenridge W. J. & J. R. Tester (1961) Growth, local movements and hibernation of the Manitoba toad, *Bufo hemiophrys*. Ecology, 42:637-646.

Brooks, J. E., E. Ahmad, I. Hassain, & M. H. Khan (1989) The agricultural importance of the wild boar (*Sus scrofa* L.) in Pakistan. Tropical Pest Management, 35:278-281.

千葉徳爾 (1995) 「オオカミはなぜ消えたか」. 新人物往来社, 279p, 東京.

- 中国四国農政局島根統計情報事務所 (1995) 「石央地域の農林業累年統計」. 中国四国農政局島根統計情報事務所, 52p, 松江.
- 中国四国農政局島根統計情報事務所 (2000) 「第47次島根農林水産統計年報」. 中国四国農政局島根統計情報事務所, 246p, 松江.
- 中国四国農政局島根統計情報事務所 (2001) 「2000年世界農林業センサス 浜田・江津・那賀地域統計書」. 中国四国農政局島根統計情報事務所, 76p, 松江.
- Cousse, S., F. Spitz, M. Hewison, & G. Janeau (1994) Use of space by juveniles in relation to their postnatal range, mother, and sibling: an example in the wild boar, *Sus scrofa* L.. Canadian journal of Zoology, 72:1691-1694.
- Dardaillon, M. (1986) Seasonal variations in habitat selection and spatial distribution of wild boar (*Sus scrofa*) in the Camargue, southern France. Behavioural Processes, 13:251-268.
- Dardaillon, M. & G. Beugnon (1987) The influence of some environmental characteristics on the movements of wild boar *Sus scrofa*. Biology of Behaviour, 12:82-92.
- Debernardi, P., E. Macchi, A. Perrone & F. Silvano (1995)

- Distribution of wild boar (*Sus scrofa*) in Piedmont and Aosta valley (NW Italy). Journal of Mountain Ecology, 3:141-144.
- Eriksson, O. & M. Petrov (1995) Wild boars (*Sus scrofa scrofa* L.) around Chernobyl, Ukraine. Seasonal feed choice in an environment under transition : A baseline study. IBEX Journal of Mountain Ecology, 3:171-173.
- Erkinaro, E., K. Heikura, E. Lindgren & S. Sulkava (1982) Occurrence and spread of the wild boar (*Sus scrofa*) in eastern Fennoscandia. Memoranda Societas Fauna et Flora Fennica, 58:39-47.
- Fournier-Chambrillon, C., D. Maillard & P. Fournier (1995) Diet of the wild boar (*Sus scrofa* L.) inhabiting the Montpellier Garrigue. Journal of Mountain Ecology, 3:174-179.
- 藤森新作・福与徳文・深山一弥 (1997) 中山間市町村の実態と活性化戦略(その1) —全国アンケート調査結果の概要—. 農業研究センター研究資料, 35:1-121.
- Fradrich, H. (1965) Zur biologie und ethologie des warzenschweines (*Phacochoerus aethiopicus* Pallas),